

INFORMACIÓN PARA PACIENTES PORTADORES DE PICC-port

NOMBRE DEL PACIENTE:

FECHA DE IMPLANTE:



▸ Qué es?

Dispositivo de Acceso Vascular (DAV) implantado en el tercio medio del brazo, utilizado para un tratamiento intravenoso específico.

Cuidados tras la inserción

- La pequeña incisión realizada al colocar el catéter se cierra con pegamento estéril, a medida que pasen los días y la herida cicatrice este pegamento se caerá poco a poco.
- Es normal que aparezca un hematoma en la zona que no suele relacionarse con dolor y que desaparecerá con el tiempo. Puede aplicar hielo en la zona durante las primeras 48 horas.
- No hay ninguna sutura externa ni interna que retirar.
- Los primeros días la zona podrá o estar hinchada y dolorida.
- Puede, según indicación de su médico, tomar algún analgésico.
- Mantener la zona cubierta durante 3 días, evitando que se moje durante la ducha.
- Transcurridos tres días retire el apósito, ya puede ducharse, pero sin aplicar agua ni jabón directamente.
- No debe levantar el brazo portador por encima del hombro durante la primera semana, después podrá realizar movimientos normales.
- No hacer fuerza ni levantar peso exagerado. Evite realizar ejercicios que amenacen la integridad de la piel en la zona de inserción. Puede hacer vida normal pasados 10 días.

Cuidados posteriores tras tres días de su inserción

- Mientras no se esté utilizando puede realizar actividades normales de la vida diaria, como ducharse o dormir sobre el lado del catéter.
- La zona del catéter debe limpiarse normalmente, vigilando cualquier cambio de textura o color.
- Evitar cualquier elemento que presione el brazo, como ropa muy ajustada o toma de presión arterial.
- Evitar cualquier tipo de pinchazo en el brazo, extraer sangre o cualquier tipo de vacuna.
- Durante el tratamiento intravenoso en domicilio tener sumo cuidado de no tirar de las conexiones y/o de la aguja evitando así una extracción parcial o total de la aguja que podría dar lugar a un hematoma y/o oclusión del PICC-port.
- Una vez finalizados sus ciclos de quimioterapia pautados, el catéter puede pasar tiempo sin ser utilizado, no olvide que debe ser revisado cada dos meses para que siga siendo normofuncionante.
- Si presenta algún problema o complicación debe acudir a su centro sanitario de referencia, hospital de día de oncohematología o al equipo que realizó el procedimiento de implante del PICC-port.

EQUIPO DE INFUSIÓN Y ACCESO VASCULAR del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

Teléfonos de contacto de lunes a viernes de 08:00h a 15:00h: 927 25 64 42. Extensión: 51840.

EIAV - CHUCC